

Back-Mo



Corrector de carencias de molibdeno en equilibrada combinación con boro.

Nutrición

Descripción

Back-Mo® es un corrector de carencias de molibdeno (Mo) en equilibrada combinación con boro (B).

Back-Mo® es un producto de fácil asimilación por las plantas y un buen transportador de iones metálicos. La aplicación de **Back-Mo®** proporciona un nivel adecuado de molibdeno en las plantas, lo que permite a este microelemento esencial intervenir en diferentes procesos fisiológicos como es el metabolismo del nitrógeno, la síntesis de proteínas y de algunas enzimas. Mejora el cuajado del cultivo, aumenta la concentración de clorofila en las plantas.

Back-Mo® interviene en el metabolismo del nitrógeno y disminuye la acumulación de nitratos para favorecer la de aminoácidos y proteínas como reservas. Por esto último, **Back-Mo®** se recomienda como parte de las estrategias de preparación hacia el receso invernal.

Principales beneficios

- ▶ Complejante específico, estable y formulado para aumentar su eficacia de acción.
- ▶ Compatibilidad con fertilizantes tradicionales.
- ▶ Trabajo en amplios rangos de pH de agua de aplicación.
- ▶ Formulaciones limpias y sin riesgos para la salud humana.
- ▶ Productos libres de residuos en la fruta.
- ▶ Aplicación fertirriego y foliar.

Especificaciones técnicas

2,95 % p/p
0,81 % p/p

3,29 % p/v
0,90 % p/v

Molibdeno (Mo)
Boro (B)

Densidad

1,12 g/cc

Formulación

SL (Concentrado soluble).

Teléfonos (+56 72) 2585 210 (+56 72) 2553 696
info.chile@rovensanext.com
www.rovensanext-latam.com

Parcela 19 Lote A -1 N°2
San José de Las Mercedes
Requínoa, VI Región
Chile



Recomendaciones de uso



Aplicación fertirriego y foliar			
Cultivo	cc/100 L	L/ha*	Observaciones**
Vides, Cerezo, Ciruelo, Nectarín, Duraznero, Almendro,	50-70	0,5-1,0	· Prefloración. · Posfloración.
Manzano, Peral, Nogal, Avellano, Arándano, Kiwi	100-150	1,5-2,0	· Previo al receso invernal.
Tomate, Pimentón, Sandía, Melón, Zapallo		1,0-1,5	· 1 y 2 aplicaciones a partir de 4 hojas desarrolladas.
Lechuga, Espinaca, Repollo, Coliflor, Brócoli			· 1 y 2 aplicaciones a partir de 4 hojas desarrolladas.
Poroto, Arveja, Haba			· Con plantas de 10 cm. de altura.
Alfalfa			· Después de un corte.
Raps	300-400	1,5-2	· Pre flor a inicio de flor; repetir en plena flor.

(*) **Back-Mo®** puede ser aplicado vía riego a dosis de 2-3 L/ha, según nivel de necesidad.

Compatibilidad

No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina, o que contengan fosfitos.

Presentación: **5 y 20 L.**