

Bioactivador metabólico sistémico; aumenta tolerancia al estrés biótico y abiótico; potencia la brotación equilibrada.

Bioestimulante

Descripción

BROTONE® es una combinación de elementos minerales seleccionados, los cuales están complejados con lignosulfonatos específicos. Estos contribuyen en la absorción y distribución de forma eficaz los fotoasimilados y minerales dentro la planta, mejorando la calidad de la fruta, producción del huerto y homogenizando procesos de esta, tales como brotación, relación parte aérea/sistema radicular y potenciando fotosíntesis.

BROTONE® además, es un potente bioestimulante que ayuda a la planta a superar decaimiento, fitotoxicidad y condiciones adversas, debido a estrés biótico y abiótico.

BROTONE® posee gran estabilidad, rápida absorción por hojas, tallos y raíces, y fácil traslocación en la planta, tanto ascendente como descendente, lo que hace especialmente indicado para los periodos de brotación y llenado de frutos.

Principales beneficios

- ▶ Aumenta el rendimiento y calidad de la fruta.
- ▶ Reactiva el metabolismo y mejora la tolerancia de la planta frente a situaciones de estrés (intoxicación, plagas, enfermedades, sequía, bajas temperaturas, etc).
- ▶ Rápida absorción y elevada sistemía, generando una rápida respuesta del huerto.
- ▶ Induce y homogeniza la brotación equilibrada.
- ▶ Promueve una eficiente traslocación de minerales.
- ▶ Aplicación vía riego y foliar.

Especificaciones técnicas

5,6 % p/p	Nitrógeno total (N)
1,52 % p/p	Cobre (Cu)
0,72 % p/p	Manganeso (Mn)
0,47 % p/p	Zinc (Zn)
	Agente complejante: Lignosulfonato

Densidad

1,240 g/L (a 20°C)

Formulación

SC (Suspensión concentrada).

Teléfonos (+56 72) 2585 210 (+56 72) 2553 696
info.chile@rovensanext.com
www.rovensanext-latam.com

Parcela 19 Lote A -1 N°2
San José de Las Mercedes
Requínoa, VI Región
Chile



Recomendaciones de uso



Aplicación fertirriego y foliar			
Cultivo	cc/100 L	L/ha*	Observaciones
Vid de mesa, Vinífera y Pisuera	200-300	2,0-4,0	· Con brotes de 5 a 10 cm., repetir a los 7 días. · En crecimiento de bayas, junto con GA3. · En postcosecha.
Almendro, Cerezo, Néctarín, Duraznero, Ciruelo**			
Peral, Manzano			
Nogal, Avellano europeo			
Olivo			
Kiwi			
Cítricos, Palto			
Arándanos, Fambueso Zarzaparrilla			
Frutilla			
Hortalizas en general			1,0-2,5
Lechuga			
Haba, Arveja, Poroto		· Desde planta de 10cm., de altura a pre-flor.	
Papa			1,5-3,0
Huerto en formación		2,0-3,0	· Desde brotación, cada 15 días.

(*) En frutales, **BROTONE®** puede ser aplicado vía riego en dosis de 5 L/ha.
 (**) En ciruelos no aplicar vía foliar, sólo vía riego.

brotone®



Bioactivador metabólico sistémico; aumenta tolerancia al estrés biótico y abiótico; potencia la brotación equilibrada.

Bioestimulante

Compatibilidad

BROTONE® es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y productos nutricionales presentes en el mercado. No mezclar con aceites, aminoácidos, azufres, cobres, captan o ziram. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.

Modo de aplicación

No necesita ninguna condición especial ni manejo en estanque de mezcla, salvo las consideradas en el apartado de "Compatibilidad". En huertos con follaje debilitado, senescente u oxidado, considerar aplicar vía riego a la dosis recomendada.

Presentación: **5 y 20 L.**