

Bioestimulante concentrado en extracto de *Ascophyllum nodosum* y metabolitos antiestrés en polvo de alta solubilidad, para aplicación foliar y vía riego.

Bioestimulante

Descripción

IBERMAR PLUS® es un bioestimulante elaborado a base de algas marinas de la especie *Ascophyllum nodosum*, formulado como polvo soluble (SP). Formulado para aplicaciones foliares y vía riego durante periodos de alta demanda energética para la aplanta, evitando el estrés en diferentes cultivos.

IBERMAR PLUS® concentra más de 60 compuestos naturales: macro y micronutrientes, libres de impurezas y metales pesados. Destaca su alto contenido de ácido algínico, beta, manitol y potasio, además de betaínas, amino ácidos e hidratos de carbono, todos compuestos naturales para potenciar el crecimiento y desarrollo de la planta.

Principales beneficios

- ▶ Potente efecto antiestrés y bioestimulante.
- ▶ Elevada solubilidad y fácil aplicación.
- ▶ Amplia compatibilidad en mezcla y equipos de aplicación.
- ▶ Aplicación foliar y vía riego.

Especificaciones técnicas

49,3 % p/p	Materia orgánica
3,32 % p/p	Nitrógeno
2,51 % p/p	Fósforo
16,46 % p/p	Potasio
≥ 17 % p/p	Ácido algínico
≥ 3 % p/p	Manitol

Formulación

SP (Polvo soluble en agua).



Recomendaciones de uso



Aplicación fertirriego y foliar			
Cultivo	gr/100 L	Kg/ha*	Observaciones
Vides, Kiwi	50-75	0,5-1,0	<ul style="list-style-type: none"> · Desde brotación a postcosecha. · Aplicar cada 7-10 días.
Almendro, Nogal, Avellano europeo			
Ciruelo, Cerezo, Duraznero, Manzano, Nectarín, Peral			
Olivo, Cítricos, Palto		1,0-1,5	
Arándano, Frambueso, Frutilla		0,5-0,75	
Cereales		0,25-0,5	· Inicio de macolla. Junto a los fungicidas e insecticidas.
Cereales			· Inicio de macolla. Junto a los fungicidas e insecticidas.
Papa		0,5-1,0	· 30, 45 y 60 días post emergencia, junto a los fungicidas e insecticidas.
Hortalizas de fruto			· Desde transplante a crecimiento de frutos. Aplicar cada 7-10 días.
Hortalizas de hojas			· Desde transplante a precosecha, cada 10-15 días.
Plantación de árboles frutales	· Esparcir 2 a 3 g, por hoyo de plantación.		
(*) Aplicación vía riego: 1-3 Kg/ha. Repetir a los 20-30 días.			

ibermarplus®



Bioestimulante concentrado en extracto de *Ascophyllum nodosum* y metabolitos antiestrés en polvo de alta solubilidad, para aplicación foliar y vía riego.

Bioestimulante

Compatibilidad

IBERMAR PLUS® es compatible con la mayoría de los fitosanitarios productos nutricionales presentes en el mercado. No mezclar con productos de extrema reacción ácida o que tengan alto contenido de calcio. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa. En cereales y cultivo industriales, no aplicar junto a los herbicidas.