

tec-fort®



Insecticida natural, eficaz y de rápido efecto de control.

Bioinsecticida
Autorización SAG N° 1910

Descripción

TEC-FORT® es un insecticida natural de amplio espectro y de alta eficacia. La exclusiva tecnología de formulación PROMICELL TECHNOLOGY® aplicada a **TEC-FORT®** combina piretrinas naturales seleccionadas provenientes de las flores de *Chrysanthemum cinerariaefolium* con diversos antioxidantes, coadyuvantes y otros coformulantes para dar lugar a un bioinsecticida altamente estable y eficaz.

TEC-FORT® penetra a través de aberturas naturales y de regiones cuticulares no esclerotizadas del insecto. Una vez en su interior, actúa a nivel del sistema nervioso central, desestabilizando el impulso nervioso, lo que conlleva la muerte del insecto.

TEC-FORT® presenta una carencia de 0 días.

Principales beneficios

- ▶ Eficaz y de rápido efecto de control sobre las plagas detalladas en las recomendaciones de uso.
- ▶ Puede ser aplicado durante todo el periodo de cultivo, incluso cosecha.
- ▶ No genera resistencias y es muy apropiado para programas de manejo integrado de plagas.
- ▶ Formulación de fácil y limpia aplicación.

Especificaciones técnicas

2,25 % p/v	Extracto de crisantemo (<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>) (22,5 g/L)
100% p/v (1L)	Coformulantes c.s.p

Formulación

EC (concentrado emulsionable).

Teléfonos (+56 72) 2585 210 (+56 72) 2553 696
info.chile@rovensanext.com
www.rovensanext-latam.com

Parcela 19 Lote A -1 N°2
San José de Las Mercedes
Requínoa, VI Región
Chile



Recomendaciones de uso



Aplicación foliar			
Cultivo	Plaga	Dosis cc/hL	Observaciones
Arándano	Capachito de los frutales (<i>Asynonychus cervinus</i>)	100-200	· Se recomiendan entre 4 y 6 aplicaciones, desde aparición de individuos adultos hasta precosecha, con un mojamiento de 800 L/ha, según presión de la plaga.
Cerezo, Duraznero, Nectarino, Ciruelo	Pulgón verde del duraznero (<i>Myzus persicae</i>)	50	· Se recomiendan hasta 6 aplicaciones, desde aparición de individuos adultos hasta precosecha, según presión de la plaga.
Vid de mesa	Chanchito blanco de la vid (<i>Pseudococcus viburni</i>)	50-200	· Se recomiendan hasta 6 aplicaciones, desde aparición de individuos según monitoreo de plagas, con un mojamiento de 1500 L/ha, o de acuerdo al desarrollo del follaje.
Cerezo	Mosca de alas manchadas (<i>Drosophila suzukii</i>)	200	· Se recomiendan hasta 4 aplicaciones, desde aparición de individuos según monitoreo de plaga, con una frecuencia cada 7 días.

Compatibilidad

No se recomienda mezclar **TEC-FORT®** con otros productos agroquímicos.

Condiciones determinantes para una aplicación segura y eficaz

Se recomienda su utilización en horas de baja luminosidad (al atardecer o al amanecer), y con temperaturas del aire de entre 5°C y 30°C. No aplicar con viento superior a 15 km/hora. No aplicar con temperaturas superiores a 30°C. No aplicar si se esperan lluvias dentro de las próximas 3 horas siguientes a la aplicación. No usar producto preparado del día anterior.

Presentación: **1, 5 y 20 L.**