

Back-CaB



Corrector nutricional de calcio y boro, complejo con ácidos carboxílicos y etanolaminas. Aplicación foliar y vía riego.

Nutrición

Descripción

Back CaB® es un formulado nutricional de calcio y boro apto para aplicación a frutales, hortalizas y cultivos. Sus contenidos de calcio y boro se encuentran complejados en solución mediante ácidos carboxílicos y etanolaminas.

Back CaB® garantiza una rápida absorción y translocación de calcio y boro al interior de la planta. Su formulación es de óptima calidad, libre de cloruros, nitratos y carbonatos, lo cual garantiza que las aplicaciones sean seguras y limpias; libres de residuos y depósitos.

Principales beneficios

- ▶ Complejante específico, estable y formulado para aumentar su eficacia de acción.
- ▶ Compatibilidad con fertilizantes tradicionales.
- ▶ Trabajo en amplios rangos de pH de agua de aplicación.
- ▶ Formulaciones limpias y sin riesgos para la salud humana.
- ▶ Productos libres de residuos en la fruta.
- ▶ Aplicación foliar y fertirriego.

Especificaciones técnicas

8,60 % p/p

0,56 % p/p

11,95 % p/v

0,78 % p/v

Óxido de Calcio (CaO)

Boro (B)

Agente complejante: Ácidos carboxílicos y etanolamina.

Formulación

SL (Concentrado Soluble)

Teléfonos (+56 72) 2585 210 (+56 72) 2553 696
info.chile@rovensanext.com
www.rovensanext-latam.com

Parcela 19 Lote A -1 N°2
San José de Las Mercedes
Requínoa, VI Región
Chile



Back·CaB



Recomendaciones de uso



Aplicación fertirriego y foliar			
Cultivo	cc/100 L	L/ha	Observaciones
Vid	200-300	2,0-3,0	· Preflor-Flor. · Crecimiento inicial de bayas, 2 a 3 aplicaciones cada 7 días.
Cerezo, Ciruelo, Nectarín, Duraznero, Almendro			· Desde botón floral expuesto. · Durante el crecimiento inicial de los frutos, 2 a 3 aplicaciones cada 7 días.
Manzano, Peral			· Desde botón floral expuesto. · Durante el crecimiento inicial de los frutos, 2 a 3 aplicaciones cada 7 días.
Nogal, Avellano			· Desde botón floral expuesto. · Durante el crecimiento inicial de los frutos, 2 a 3 aplicaciones cada 7 días.
Arándano, Frambueso, Frutilla, Zarparrilla			· Desde botón floral expuesto. · Durante el crecimiento inicial de los frutos, 2 a 3 aplicaciones cada 7 días.
Kiwi			· Preflor-Flor. · Crecimiento inicial de los frutos.
Tomate, Pimentón	150-200	1,0-2,0	· Iniciar aplicaciones junto con el inicio de la floración, cada 7 a 14 días.
Sandía, Melón, Zapallo			· Iniciar aplicaciones junto con el inicio de la floración, cada 7 a 14 días.
Lechuga, Apio			· Desde el segundo tercio del cultivo hasta pre-cosecha, cada 7 a 14 días.
Palto y Cítricos	200-300	2,0-3,0	· Desde inicio de flor. · Durante el crecimiento inicial de los frutos, aplicaciones cada 7 a 14 días.

Aplicación vía riego: Frutales: 4,0 -6,0 L. Hortalizas: 2,0-4,0 L.

Compatibilidad

Back CaB® se puede mezclar con la mayoría de los productos habitualmente empleados, aunque se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad antes de la aplicación