

## Corrector nutricional de magnesio complejado con gluconatos.

**Nutrición**

### Descripción

**BACK Mg®** es un corrector nutricional a base de magnesio, complejado con gluconatos. Es especialmente formulado para aplicación foliar o fertirriego.

**BACK Mg®** garantiza una rápida absorción y translocación de magnesio al interior de la planta. Su formulación es de óptima calidad, libre de cloruros, nitratos y carbonatos, lo cual garantiza que las aplicaciones sean seguras y limpias; libres de residuos y depósitos.

### Principales beneficios

- ▶ Complejante específico, estable y formulado para aumentar su eficacia de acción.
- ▶ Compatibilidad con fertilizantes tradicionales.
- ▶ Trabajo en amplios rangos de pH de agua de aplicación.
- ▶ Formulaciones limpias y sin riesgos para la salud humana.
- ▶ Productos libres de residuos en la fruta.
- ▶ Aplicación foliar y fertirriego.

### Especificaciones técnicas

**6,60 % p/p**

**9,24 % p/v**

Magnesio total (MgO)\*

\*Agente Complejante: *Ácido glucónico.*

### Formulación

SL (Concentrado Soluble).



## Recomendaciones de uso



Aplicación fertirriego y foliar			
Cultivo	cc/100 L	L/ha*	Observaciones**
Vides	200-300	2,0-4,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Brotación, 2 a 3 aplicaciones cada 7 días.</li> <li>· Crecimiento inicial de las bayas, 2 a 3 aplicaciones cada 7 días.</li> <li>· En post-cosecha.</li> </ul>
Cerezo, Ciruelo, Nectarín, Duraznero, Almendro			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Durante el desarrollo de frutos y brotes.</li> <li>· En post-cosecha.</li> </ul>
Frutilla, Arándano, Frambueso, Zarpaparrilla			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Durante el desarrollo de frutos y brotes.</li> <li>· En post-cosecha.</li> </ul>
Kiwi			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Brotación, 2 a 3 aplicaciones cada 7 días.</li> </ul>
Olivo			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Desde inicios de formación del racimo floral.</li> </ul>
Cítricos			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Durante los flushes vegetativos de primavera y otoño.</li> </ul>
Tomate, Pimentón	150-200	1,0-2,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Desde trasplante, cada 7 a 14 días.</li> </ul>
Sandía, Melón, Zapallo			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Desde trasplante, cada 7 a 14 días.</li> </ul>
Papa			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Desde 30 días post-emergencia, cada 15 a 20 días.</li> </ul>
(*) <b>BACK Mg®</b> puede ser aplicado vía riego a dosis de: Frutales 3-6L/ha: Hortalizas: 2-4L/ha.			

## Compatibilidad

**BACK Mg®** se puede mezclar con la mayoría de los productos habitualmente empleados, aunque se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad antes de la aplicación.